

ACETAMINOPHEN (Por la boca)

Sirve para tratar el dolor leve y para reducir la fiebre.

Marca(s) : Tylenol, Tylenol Children's, Tylenol Extra Strength, Tylenol Infants' Original, Tylenol Infants', Tylenol Arthritis, Tylenol Junior Strength, T-Painol, Q-Pap, Cetafen, Dolono, Tycolene, APAP, Genapap, Genebs

Existen muchas otras marcas de este medicamento.

Este medicamento no debe ser usado cuando:

No tome este medicamento si alguna vez usted ha tenido una reacción alérgica al acetaminofén.

Forma de usar este medicamento:

Tableta, Cápsula, Líquido, Tableta masticable, Tableta de liberación prolongada

- Su médico le dirá la cantidad de medicamento que usted debe tomar y la frecuencia para tomarlo. No tome más cantidad de medicamento ni lo tome con más frecuencia de lo ordenado por su médico. **El consumo de más de 4 gramos (4.000 miligramos) de acetaminofén en un día (24 horas) es peligroso.**
- Si usted está tomando este medicamento sin la indicación de su médico, siga las direcciones que vienen en el empaque del medicamento. No tome este medicamento durante más de 10 días seguidos a menos que el médico le indique otra cosa.
- Usted puede tomar este medicamento con o sin comida.
- La **tableta masticable** debe ser masticada o triturada antes de tragarla.
- Agite bien **el líquido oral** antes de cada uso. Mida el líquido usando una cuchara o taza especialmente marcada para medir el medicamento.
- No triture, mastique o rompa la **tableta de liberación prolongada**. Trague (pase) la tableta entera.
- Tome un vaso lleno de agua cuando tome este medicamento.

Si una dosis es olvidada:

- Si usted está tomando este medicamento siguiendo un horario fijo y olvida tomar una dosis, tómelo lo más pronto posible. Si es casi hora de su próxima dosis, omita la olvidada y espere hasta entonces para tomar el medicamento.
- No use medicamento adicional para reponer la dosis olvidada.

Forma de guardar y botar este medicamento:

- Guarde el medicamento a temperatura ambiente en un envase cerrado, alejado del calor, la humedad y la luz directa. No lo congele.
- Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y nunca comparta sus medicamentos con otras personas.

Medicamentos y alimentos que debe evitar:

Consulte con su médico o farmacéutico antes de usar cualquier medicamento, incluyendo los que compra sin receta médica, las vitaminas y los productos herbales.

- No consuma alcohol mientras esté usando este medicamento. El acetaminofén puede lesionar su hígado y el consumo de alcohol aumenta este riesgo. **Si usted consume 3 o más bebidas alcohólicas cada día, no tome acetaminofén sin antes consultar con el médico.**
- Tampoco use otros medicamentos que contengan acetaminofén, incluyendo los productos de marcas como el Alka-Seltzer Plus®, Comtrex®, Drixoral®, Excedrin Migraine®, Midol®, Sinutab®, Sudafed®, Theraflu® y Vanquish®. **Lea cuidadosamente todas las etiquetas de los demás medicamentos que esté usando para comprobar que no contienen acetaminofén.**

Precauciones durante el uso de este medicamento:

- No olvide informarle al médico si usted está embarazada o dando de lactar, o si tiene enfermedad en el hígado o riñón.
- Infórmele al médico si sus síntomas no mejoran o si presenta nuevos síntomas como enrojecimiento o hinchazón. Si usted ha estado usando este medicamento para tratar la fiebre y ésta le dura más de 3 días, suspenda el medicamento y llame al médico.
- No olvide informarle al médico o dentista encargado de atenderle que usted está usando este medicamento. El acetaminofén puede afectar los resultados de ciertos exámenes de laboratorio.

Efectos secundarios que pueden presentarse durante el uso de este medicamento:

Consulte inmediatamente con el médico si nota cualquiera de estos efectos secundarios:

- Reacción alérgica: picazón o ronchas, hinchazón en la cara o en las manos, hinchazón o cosquilleo en la boca o garganta, opresión en el pecho, dificultad para respirar
- Sangre en las heces o heces de color negro o alquitranadas
- Vahídos, desmayos, debilidad, sudor
- Náuseas, vómito, pérdida del apetito, dolor severo de estómago
- Sangrado o moretones inusuales
- Vómito de sangre o material con apariencia a café molido
- Color amarillo en los ojos o en la piel

Consulte con el médico si nota otros efectos secundarios que cree son causados por este medicamento.

Esta información sirve solamente para educar. Esta información no es el consejo médico para condiciones o tratamientos individuales. Consulte a su doctor, enfermera, o farmacéutico antes de seguir cualquier régimen médico para saber si es seguro y eficaz para usted.

Copyright © 1974-2004 MICROMEDEX Thomson Healthcare. Todos derechos son reservados.