

ASPIRIN (Por la boca)

Trata dolor, fiebre, artritis, y inflamación. También puede ser usada para reducir el riesgo de ataque al corazón.

Marca (s) : Ecotrin, Ecotrin Adult Low Strength, Aspiatab, Bayer Genuine Aspirin, Norwich Aspirin, Pravigard Pac Kit, Bayer Extra Strength, Aspir-Low, Bayer Aspirin Children's, St. Joseph Pain Reliever, Aspirin Adult Low Strength, Easprin, Enterocote, Bayer Aspirin Regimen, Ecpirin

Existen muchas otras marcas de este medicamento.

Este medicamento no debe ser usado cuando:

No tome esta medicina si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a la aspirina o a medicinas para el dolor de la artritis (como Motrin®, Advil®, Naprosyn®). La aspirina no debe dársele a los niños o jovencitos que tienen fiebre, varicela o síntomas de resfriado o infección viral, porque la aspirina puede causar una enfermedad seria que se llama el síndrome de Reye. No tome esta medicina si usted tiene una úlcera del estómago o cualquier problema hemorrágico,

Forma de usar este medicamento:

Tableta, Tableta masticable, Tableta recubierta, Tableta de liberación programada

- Su médico le dirá la cantidad de medicamento que usted debe usar y la frecuencia para usarlo. No use más cantidad de medicamento ni lo use con más frecuencia de lo ordenado por su médico.
- Si está usando este medicamento sin prescripción médica, siga las instrucciones que vienen en la etiqueta.
- Lo mejor es tomar este medicamento con comida o leche.
- Trague la **tableta, capsula, o tableta recubierta** entera. No la aplaste, mastica, o quebra. Las **tabletas masticables** se pueden masticar completamente o también tragar enteras.
- Mastique completamente el chicle para recibir tanta medicina como posible. Toma un copa (8 onzas) de agua después de masticar el chicle.

Si una dosis es olvidada:

- Si olvida una dosis de su medicamento, úselo lo más pronto posible. Si es casi hora de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y espere hasta entonces para usar el medicamento. No use medicamento adicional para reponer la dosis olvidada.

Forma de guardar y botar este medicamento:

- Guarde la medicina en un envase bien cerrado a temperatura ambiente, alejada del calor, la humedad, y la luz directa.
- Bote las medicinas cuya fecha de vencimiento haya expirado y las medicinas que ya no necesita siguiendo las instrucciones del farmacéutico, médico o paramédico.
- Guarde todas las medicinas fuera del alcance de los niños.

Medicamentos y alimentos que debe evitar:

Consulte con su médico o farmacéutico antes de usar cualquier medicamento, incluyendo los que compra sin receta médica, las vitaminas y los productos herbales.

- La aspirina puede causarle sangrado estomacal. y beber alcohol puede empeorar esto. Si usted consume 3 o más bebidas alcohólicas al día, pregunte al doctor si puede tomar también el acetaminofén. Una bebida alcohólica es lo mismo que 4 onzas de vino, 12 onzas de cerveza o 1 onza de licor duro (el whiskey, la ginebra y otros).
- Informe al doctor si usted también está usando un anticoagulante (como Coumadin®), probenecid, medicina con cortisona (como prednisona), o metotrexato.
- Informe al doctor si usted también está usando ticlopidine (Ticlid®), dipyridamole (Persantine®), o sulfipirazone (Anturane®).

Precauciones durante el uso de este medicamento:

- Informe al doctor antes de usarlo si está embarazada o dando de lactar, o si tiene asma, problemas del riñón o úlceras
- La aspirina puede producir resultados falsos en algunas pruebas de azúcar en la orina.

Efectos secundarios que pueden presentarse durante el uso de este medicamento:

Consulte inmediatamente con el médico si nota cualquiera de estos efectos secundarios:

- Dolor estomacal severo.
- Vómito sanguinolento o parecido a café molido.
- Sangre en las heces o la orina.
- Sarpullido o ronchas en la piel con mucha picazón
- Hinchazón de la cara o párpados
- Silbidos al respirar o problema respirando
- Mareo o aletargamiento severo
- Zumbido en los oídos

Consulte con el médico si nota los siguientes efectos secundarios menos graves:

- Malestar estomacal
- Ardor

Consulte con el médico si nota otros efectos secundarios que cree son causados por este medicamento.

Esta información sirve solamente para educar. Esta información no es el consejo médico para condiciones o tratamientos individuales. Consulte a su doctor, enfermera, o farmacéutico antes de seguir cualquier régimen médico para saber si es seguro y eficaz para usted.

Copyright © 1974-2004 MICROMEDEX Thomson Healthcare. Todos derechos son reservados.