

CAPSAICIN (Para la piel)

Alivia el dolor en las articulaciones, causado por la artritis o torceduras. Se usa también para el dolor de un nervio (neuralgia) que puede ser causada por la culebrilla o la neuropatía diabética.

Marca(s) : Zostrix High Potency, Trixaicin HP, Capsagesic-HP Arthritis Relief, Zostrix Sports, Rid-A-Pain-HP, Zostrix, Trixaicin, Rid-A-Pain, Arthricare For Women Quick-Drying, Arthricare For Women Silky Dry, Capsin, Arthricare For Women, Sportsmed, Pain Enz, Double Cap
Existen muchas otras marcas de este medicamento.

Este medicamento no debe ser usado cuando:

Usted no debe usar este medicamento si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a capsaicin o al ají.

Forma de usar este medicamento:

Crema, Gel/Jalea, Loción, Líquido, Barra, Almohadilla, Ungüento, Hoja delgada

- Su médico le dirá la cantidad de medicamento que debe usar y la frecuencia para hacerlo. Si usted está usando este medicamento sin receta médica, lea y siga las instrucciones en la etiqueta.
- Use este medicamento en la piel únicamente. No permita que el medicamento le toque su boca, ojos o nariz. Si le cae medicamento en sus ojos, enjuáguelos con abundante agua fría. Llame a su médico si tiene dolor en los ojos o si el enrojecimiento no desaparece.
- Lave sus manos antes y después de usar este medicamento. Si está usando el medicamento para tratar el dolor de la artritis en sus manos, espere 30 minutos después de usar el medicamento para lavarse las manos. Evite tocar las partes de su piel sensitivas al medicamento, mientras tiene el medicamento en sus manos.
- Agite bien la **loción** antes de usarla.
- Aplique una cantidad pequeña de su medicamento en forma de **crema, loción, ungüento, gel o líquido** sobre la zona afectada. Frótelas hasta que no vea el medicamento sobre su piel.
- Retire el **parche** de su envoltorio y aplíquelo en su piel sobre la zona afectada. No aplique el **parche** antes de bañarse o de hacer ejercicios.
- Usted puede sentir ardor o dolor cuando frota el medicamento. Esto pasa generalmente después de haber usado el medicamento por unos días. Usar el medicamento con menos frecuencia de lo que le han indicado, puede hacer que el ardor y dolor continúen por un período más largo.
- No cubra o tape la zona tratada con un vendaje apretado. No coloque un cojín eléctrico sobre la zona tratada con el medicamento.

Si una dosis es olvidada:

- Use la dosis olvidada lo más pronto posible.
- No use la dosis olvidada si es hora de su próxima dosis regular.
- No use más de una dosis al mismo tiempo.

Forma de guardar y botar este medicamento:

- Guarde el medicamento a temperatura ambiente, alejado del calor y la luz directa. No lo congele.
- Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Medicamentos y alimentos que debe evitar:

Consulte con su médico o farmacéutico antes de usar cualquier medicamento, incluyendo los que compra sin receta médica, las vitaminas y los productos herbales.

- Consulte con el médico antes de usar otros medicamentos para la piel en la misma zona en la que está aplicando capsaicin.

Precauciones durante el uso de este medicamento:

- Si está embarazada o dando de lactar (amamantando), informe al médico antes de usar este medicamento.
- No use este medicamento en las lesiones abiertas, llagas, peladuras o piel irritada.
- Usted puede necesitar usar este medicamento por 2 semanas o más, antes de que le alivie su dolor. Continúe usando este medicamento todos los días. Si este medicamento no le ha hecho efecto después de usarlo por un mes, o si su dolor empeora después de una semana, consulte con su médico.

Efectos secundarios que pueden presentarse durante el uso de este medicamento:

Consulte inmediatamente con el médico si nota cualquiera de estos efectos secundarios:

- Irritación severa, enrojecimiento o hinchazón que no existía antes de empezar a usar este medicamento.

Consulte con el médico si nota los siguientes efectos secundarios menos graves:

- Ardor o dolor

Consulte con el médico si nota otros efectos secundarios que cree son causados por este medicamento.

Esta información sirve solamente para educar. Esta información no es el consejo médico para condiciones o tratamientos individuales. Consulte a su doctor, enfermera, o farmacéutico antes de seguir cualquier régimen médico para saber si es seguro y eficaz para usted.

Copyright © 1974-2004 MICROMEDEX Thomson Healthcare. Todos derechos son reservados.